



关于宫颈癌筛查 的误解与事实



误解

(我不需要宫颈筛查，因为)

我很健康，没有任何症状。

我已无性生活

我只有 1 个性伴侣

我是同性恋

我已经过了更年期/我年纪大了/我已经过了生育年龄

我做了子宫切除术（摘除子宫）

我不认同自己是女性

我已经接种了人类乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗

事实

(但事实是)



筛查测试可以发现异常细胞，在癌变之前是可以治疗的

即使您过去曾经有过性行为，也需要定期进行宫颈筛查。通过以前的性接触传播的任何人类乳头瘤病毒 (HPV) 都可以在您的体内潜伏 10 到 15 年，并可能导致癌症。

即使只有个性伴侣，女性也会感染人类乳头瘤病毒 (HPV)。如果您的伴侣有多个性伴侣，患宫颈癌的风险也会更高。

人类乳头瘤病毒 (HPV) 是通过生殖器皮肤直接接触传播的，因此即使您只与女性发生过性行为，您仍然有风险。

如果您的年龄在 21 至 69 岁之间，并且曾经有过性行为，则需要定期进行宫颈筛查。

征询您的医护人员，了解您的子宫颈是否仍然完整。

任何拥有完整宫颈的人都需要定期进行宫颈筛查。

人类乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗并不能预防导致宫颈癌的所有类型的 HPV，因此需要定期进行宫颈筛查。

HPV= 人乳头状瘤病毒